

Kirurgisk behandling af svulst i testiklen

Du skal opereres for at vurdere, om en knude/svulst i din testikel er kræft.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN

Under operationen er du fuldt bedøvet

Inden du bliver bedøvet, får du lagt et drop, som giver dig væske gennem et plastkrør i håndryggen. Lægen, der skal operere, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Selve operationen


Vi tager en vævsprøve af knuden. Vævsprøven bliver sendt til analyse, som viser, om knuden er en kræftknude. Svaret på analysen får vi med det samme, og vi kan herefter fjerne testiklen, hvis det viser sig at være kræft. Er der tale om kræft, tager vi samtidig en prøve fra den anden testikel for at undersøge, om denne er rask.

Operationen varer cirka 1 time. Efter operationen bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret, indtil du er vågen efter bedøvelsen. Først herefter bliver du kørt tilbage på sengestuen. Forvent, at du er tilbage på sengestuen efter 3 timer, da der går tid både før og efter operationen med forberedelse, bedøvelse, analyse af vævsprøve og opvågning.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Fjern hår omkring operationsområdet

Dagen før operationen skal du fjerne hår i de markerede felter, der er vist på tegningen. Feltet på højre lår skal være 15 x 15 cm. Du skal fjerne hårene på den side af maven, hvor du skal opereres. Brug en trimmer eller saks. En barbermaskine eller skraber efterlader små rifter, som øger risikoen for infektion i operationsområdet. Husk at rense navlen.



Mød fastende til operationen

Før du skal bedøves, skal du faste. Det er meget vigtigt, at din mavesæk er tom, for at forhindre at mad eller væske kommer over i lungerne under bedøvelsen.

Indtil 6 timer før dit mødetidspunkt må du drikke og spise, som du plejer. De sidste 6 timer, før du skal møde, må du ikke:

- spise
- drikke mælkeholdige produkter
- tygge tyggegummi, spise bolsjer eller pastiller
- ryge.

Indtil 2 timer før dit mødetidspunkt må du drikke vand, saft, kaffe og te uden mælk. Vi opfordrer dig til at drikke 2 glas saft 2 timer før din operation, da det mindsker risikoen for kvalme og ubehag efter operationen.

Tag bad og børst tænder

- Tag et brusebad om aftenen eller morgenen. Husk at rense navlen godt med en vatpind – især ved robotoperationer.
- Vi anbefaler, at du er omhyggelig med at børste dine tænder og gør det 2 gange i døgnet både før og efter operationen. God hygiejne nedsætter risikoen for infektioner efter operationen.
- Undlad at smøre dig ind i creme.
- Fjern smykker og piercing.

Medbring medicin

Medbring din medicin i original emballage. Du må først indtage eventuel morgenmedicin, når du møder på afsnittet om morgenen.

EFTER OPERATIONEN

Hurtigt ud af sengen

Det er vigtigt, at du efter operationen kommer i gang med at bevæge dig. Det mindsker risikoen for komplikationer. Du skal derfor forvente, at vi allerede få timer efter operationen beder dig om at komme ud af sengen og gå omkring. Vi støtter dig selvfølgelig i det omfang, du har brug for det.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Er indgrebet forløbet normalt, bliver du udskrevet senere samme dag og kan tage hjem. Sørg for at have en pårørende til at ledsage dig eller køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil det første døgn efter, at du har været bedøvet.

NÅR DU KOMMER HJEM

Smerter efter operationen

Du kan have lette smerter og ømhed i pungen efter operationen. Det kan vare et par uger. Det kan derfor være en god idé, at du bruger tætsiddende underbukser til at støtte pungen og penis. Har du behov for det, kan du tage smertestillende håndkøbsmedicin. Det er en god idé at købe medicinen på forhånd, så du har den, når du kommer hjem.

Hævelse og misfarvning

Huden omkring såret og ned ad penis kan være hævet og misfarvet efter operationen. Det er helt normalt og forsvinder i løbet af et par uger. Fortager hævelsen sig ikke, kommer der rødme omkring såret eller får du feber, skal du tage kontakt til din læge. Det er tegn på, at der muligvis er gået infektion i såret, hvilket du skal have undersøgt og behandlet.

Du skal ikke have fjernet tråde

Trådene i operationssåret er oftest selvopløselige. Du skal derfor ikke have dem fjernet. Skulle du mod forventning være syet med en tråd, der skal fjernes, giver vi dig besked efter operationen. I så fald skal du have fjernet tråden hos din læge efter 10 dage.

KONTROL

Kontrol og videre forløb på Onkologisk Afdeling i Aarhus

Efter operationen vil du blive indkaldt til en røntgenundersøgelse af lungerne. Svar på denne undersøgelse samt svar på vævsprøverne får du på Onkologisk Afdeling i Aarhus. Her vil I også drøfte behovet for yderligere undersøgelser, eventuelt efterbehandling og fremtidig kontrol. Efterbehandling vil enten være strålebehandling eller kemoterapi. Over 90 % af alle med testikelkræft bliver helbredt.

Nedfrysning af sæd

Selvom den ene testikel bliver fjernet, er lyst og seksualliv uændret. Din forplantningsevne afhænger af, om du skal have efterbehandling og i givet fald hvilken. Du har mulighed for at få nedfrosset sæd til senere brug. Det kan du blandt andet drøfte med lægen, som indstiller dig til operation. Når du er færdigbehandlet på Onkologisk Afdeling i Aarhus, kan der være mulighed for at få indopereret en protese i pungen. Protesen er gratis.

KONTAKT OG MERE VIDEN



På vores webside har vi samlet en række informationer om det forløb, du skal igennem. Vi anbefaler dig at besøge siden undervejs.



Besøg websiden via dette link
<https://aalborguh.m.dk/urologiforløb>
eller ved at skanne QR-koden.

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08
Mandag – fredag 8.30 – 12.00

Urologisk Dagafsnit 9

Tlf. 97 66 33 18
Mandag – fredag 08.00 – 18.00

Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 16
Hele døgnet