



Behandling af sengevædning med Desmopressin

Jeres barn har en øget urinproduktion om natten. Derfor anbefaler vi, at jeres barn påbegynder medicinsk behandling med Desmopressin, som reducerer den natlige urinproduktion.

I skal fortsat være opmærksomme på god væskefordeling i løbet af dagen, og barnet skal undgå at drikke noget efter aftensmaden. Barnet må ikke drikke mere end 200 ml til aftensmåltidet.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Vi har lavet en elektronisk recept, og I kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek i Danmark.

Startdosis er en smeltetablet, der indeholder 120 mikrogram, som skal tages $\frac{1}{2}$ – 1 time før sengetid. Tabletten lægges under tungen, hvor den opløses. Undgå væskeindtagelse fra 1 time før indtagelse til næste morgen. Indtagelse af væske lige før eller efter indtagelse af Desmopressin kan give hovedpine og kan medføre, at medicinen ikke har den ønskede effekt.

Hvis behandlingen ikke har den ønskede effekt efter 7 dage, øges dosis af Desmopressin smeltetablet til 240 mikrogram. Der kan laves ny recept på den nye dosis

Hvis barnet har effekt af behandlingen, skal I fortsætte den i 3 måneder. Herefter skal barnet holde pause med behandlingen i cirka 1 uge – udelukkende for at vurdere, om det er nødvendigt at forsætte behandlingen.

Hvis slutdosis er 240 mikrogram, skal I nedsætte dosis til 120 mikrogram i 1 måned, inden barnet holder pause fra behandlingen.

Hvis barnet får tilbagefald efter ophør eller nedtrapning af behandlingen, skal behandlingen fortsættes i yderligere 3 måneder.

BIVIRKNINGER

Der er meget sjældent bivirkninger ved behandlingen, men læs indlægssedlen i pakningen eller find mere information på www.medicin.dk.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har I spørgsmål til behandlingen, er I velkomne til at kontakte os.



Kontakt

Børneambulatoriet
Videnscenter for urininkontinens
Tlf. 97 66 3400
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 08.00 - 15.00

Mail: borneinkontinens@rn.dk

Dine aftaler

Startdato:

Startdosis: