

Kemoterapi med Cabazitaxel

Du skal i behandling med Cabazitaxel, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Cabazitaxel er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Cabazitaxel.
- I 2. og 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

Før du begynder behandlingen og efter 3 serier kemoterapi, skal du have lavet en CT-skanning og en knogleskintigrafi. Disse undersøgelser bruger vi til at vurdere, om behandlingen har haft effekt, og om din krop kan tåle kemoterapien.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du kommer til samtale hos lægen.
- Du bliver vejlet.
- Du får forebyggende medicin mod bivirkninger, Prednisolon, i en blodåre i et drop over 10 minutter.
- Dernæst får du Tavegyl® i en blodåre i et drop over 3-5 minutter.
- Herefter får du Zantac® i en blodåre i et drop over 30 minutter.

- Til sidst får du Cabazitaxel i en blodåre i et drop over 1 time.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Kør ikke bil efter behandlingen

Du får Tavegyl®, som virker sløvende. Derfor må du ikke køre bil samme dag, som du har fået behandling.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Tag Prednisolon dagen før behandlingen

Du skal tage Prednisolon (100 mg) om morgenen dagen før behandlingen med kemoterapi. Vi udleverer tabletterne til dig.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-

2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.

- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00