

# Kemoterapi med Carboplatin og Gemcitabin

Du skal i behandling med Carboplatin og Gemcitabin som begge er kemoterapi.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Carboplatin og Gemcitabin er cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Det foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag (dag 1) får du både Carboplatin og Gemcitabin.
- På den 2. behandlingsdag (dag 8) får du kun Gemcitabin.
- I den 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

Før du begynder behandlingen og efter hver 3. behandlingsserie, skal du have lavet en CT-skanning, så vi kan vurdere behandlingens effekt, og om din krop kan tåle behandlingen.

### På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du kommer til samtale hos lægen (kun dag 1).
- Du bliver vejjet.
- Du får Carboplatin i en blodåre i et drop over 1 time (kun dag 1).
- Herefter får du Gemcitabin i en blodåre i et drop over 30 minutter. Du får Gemcitabin på både dag 1 og dag 8.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder

- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx tandkød
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### **Onkologisk Afdeling**

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00