

# Behandling med Ceritinib

Du skal i behandling med Ceritinib – også kaldet Zykadia.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Ceritinib er medicin, som kan hæmme eller standse væksten af ALK-positiv lungekræft.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

På den 1. behandlingsdag får du udleveret kapsler til alle 21 dage. Du skal tage kapslerne derhjemme. Du vil blive CT-skannet efter hver 3. serie. Behandlingen gives lige så længe, den har effekt, og bivirkningerne er acceptable.

### Sådan tager du tablet Ceritinib

- Tag Ceritinib på samme tid hver dag. Det kan være morgen, eftermiddag eller aften – når det passer dig bedst.
- Tag Ceritinib mindst 2 timer efter et måltid. Du må ikke spise eller drikke andet end vand mindst 2 timer efter, at du har taget medicinen.
- Tag kapslerne med et glas vand. Tag alle kapsler over så kort tid som muligt.
- Kapslerne skal sluges hele og må ikke tygges.
- Du må ikke indtage grapefrugt eller naturlægemidler, så længe du får Ceritinib.

### Hvis du glemmer at tage kapslerne

Tag medicinen, så snart du kommer i tanke om, at du har glemt det.

Hvis der er mindre end 12 timer til næste dosis, skal du dog undlade at tage kapslerne. Forsæt i så fald

med at tage kapslerne til det næste planlagte tidspunkt.

### Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Ceritinib-kapslerne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### CT-skanning

Før du begynder behandlingen, skal du have foretaget en CT-skanning. Skanningen bruger vi som udgangspunkt for at evaluere, om behandlingen har effekt, og om du tåler den. Du skal have lavet en ny skanning efter hver 3. behandlingsserie. Du vil modtage en indkaldelse, når du skal CT-skannes.

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

### Medbring urinprøve

Medbring en urinprøve, når du kommer til behandling.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastninger.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven kan påvirkes, så dit immunforsvar kan blive påvirket.



Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.

- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både Ceritinib og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Påvirkning af hjertet.** Behandlingen kan medføre rytmeforstyrrelser i hjertet. Derfor skal du have lavet et hjertediagram (EKG) før 1. behandlingsserie og efterfølgende ved hver 2. serie.
- **Mavesmerter**
- **Udslæt**
- **Nedsat appetit**
- **Nedsat leverfunktion**
- **Nedsat nyrefunktion**
- **Betændelsestilstand i lungerne**
- **Forhøjet blodsukker**

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Allergisk reaktion

Følgende kan være tegn på en allergisk reaktion:

- Problemer med at trække vejret
- Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals
- Stærk hudkløe med rødt udslæt og knopper.

Stop med at tage Ceritinib, hvis du oplever én eller flere af de ovennævnte symptomer, og kontakt os omgående for at få hjælp.

### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38.5 eller derover
- Tegn på en allergisk reaktion
- Blødning eller tegn på infektion
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00