

# Kemoterapi med Gemcitabin, Caelyx® og Carboplatin

Du skal i behandling med Gemcitabin, Caelyx® og Carboplatin, som er kemoterapi.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Gemcitabin, Caelyx® og Carboplatin er cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i en såkaldt behandlingsserie. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Gemcitabin, Caelyx® og Carboplatin.
- 1. uge efter (på dag 8) får du igen Gemcitabin.
- I uge 3 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

### På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Din vægt bliver registreret.
- Du får Gemcitabin i en blodåre i drop over 30 minutter.
- Du får Caelyx® i drop over 1 -1½ time.
- Du får Carboplatin i drop over 1 time.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Påvirkning af knoglemarven.** Kemoterapien påvirker din knoglemarv, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver inden hver behandling.
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Forstoppelse eller diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Rød urin.** Din urin er rød i op til 1 døgn efter hver behandling på grund af farvestof i medicinen.
- **Rødme, hævelse, ømhed og smerter i hænder og fødder.** Du kan få prikkende og brændende fornemmelser eller kløe i hænder og fødder. Symptomerne aftager efter 1-2 uger. Hvis du mærker dette, er det vigtigt, at du siger det til os. Vi kan nemlig være nødt til at justere dosis på Caelyx®. Symptomerne kan afhjælpes ved at dyppe hænder eller fødder i koldt vandbad. Lad hænder og fødder være bare så meget som muligt. Undgå at hænder og fødder bliver for varme fx ved direkte sollys, varmebade eller kraftig motion, som kan give smerter i fødderne.
- **Skallet hud, betændelse eller udslæt, unormal pigmentering/farvning og negleproblemer**  
Tag eventuelt kolde bade, og undgå direkte sollys. Undgå stramtsiddende tøj, undertøj, strømper og fodtøj.
- **Irriteret slimhinde i munden.** Slimhinden i munden kan blive rød og irriteret. Du kan forebygge irritation ved at børste tænder jævnligt og lindre generne ved at skylle munden i kamillete. Tal med os hvis dette ikke afhjælper dine gener.

- **Påvirkning af hjertet.** Behandlingen kan påvirke dit hjertes pumpefunktion. Derfor undersøger vi dit hjerte, før behandlingen begynder og med jævne mellemrum i behandlingsforløbet.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.
- **Influenzasymptomer.** Du kan opleve symptomer på influenza med muskel- og ledsmerter i ugen efter behandlingen.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00