

Kemoterapi med Hycamtin®

Du skal i behandling med Hycamtin®, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Hycamtin® er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 4 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- 1. uge dag 1-5 skal du have Hycamtin® som kapsler (i nogle tilfælde kan Hycamtin® gives i et drop). Du skal tage medicinen med 24 timers mellemrum.
- I 2., 3. og 4. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du kommer til samtale hos lægen.
- Du bliver vejlet.
- Dernæst får du udleveret Hycamtin®-kapsler til alle 5 dage – du skal starte med medicinen samme dag.
- Du skal opbevare kapslerne i køleskab.
- Du får også udleveret kvalmestillende medicin.

Dag 2 til 5:

- Du skal tage den aftalte dosis Hycamtin® med 24 timers mellemrum.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge dit NemID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Diarré.** Du kan få diarré, det vil sige minimum 4 tynde afføringer på 1 dag. Du kan afhjælpe diarréen ved at tage 2 styk tablet Imodium® ved første diarré, herefter 1 styk hver 2. time, indtil der er gået 12 timer, hvor du ikke har haft diarré. Husk at drikke rigeligt med væske, cirka 2 liter i døgnet.



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Sådan forholder du dig, hvis:

- **du glemmer at tage Hycamtin®:** Tag medicinen, så snart du kommer i tanke om, at du har glemt det. Vent derefter 24 timer med at tage næste dosis medicin.
- **du ikke husker, om du har taget Hycamtin®:** Tag aldrig dobbelt dosis. Vent til næste dag, og tag medicinen, som du plejer.
- **du kaster op:** Hvis du kaster op, efter du har taget Hycamtin®, skal du vente til næste dag med at tage den næste dosis.
- **du har taget for meget Hycamtin®:** Kontakt os straks, hvis du har taget for meget Hycamtin®.

Undgå at åbne eller knuse kapslerne

Du må ikke åben eller knuse kapslerne med Hycamtin®. Hvis det sker, skal du vaske hænderne grundigt. Hvis du får medicin i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand og kontakte os.

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx tandkød
- Svimmelhed, træthed og hovedpine
- Diarré, som ikke stopper, selvom du har taget stoppende medicin og fulgt den vejledning, vi har givet dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00