

Kemoterapi med Taxol/Carboplatin i kombination med strålebehandling

Du skal i behandling med Taxol og Carboplatin, som begge er kemoterapi. Du skal også have strålebehandling. Strålebehandlingen strækker sig over 5 uger.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Taxol

Taxol er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst. Taxol er et stof, der strammer fra barken på takstræ. Det er et plantestof, som kan give allergiske reaktioner.

Carboplatin

Carboplatin er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. I uge 1 får du kemoterapi, og i uge 2 og 3 holder du pause med behandlingen. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

Forløbet i hovedtræk

- Først får du 3 serier kemoterapi.
- 3 uger efter 3. serie kemoterapi påbegynder du de 25 strålebehandlinger. Når du påbegynder strålebehandlingen, gives en strålebehandling på alle hverdage med pause i weekenderne.
- 3 uger efter endt strålebehandling genopstarter du behandlingen med kemoterapi. Du skal have yderligere 3 serier kemoterapi.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen for kemoterapi sker der følgende:

- Din vægt registreres.
- Derefter får du Taxol i en blodåre i et drop over cirka 3 timer.
- Til slut får du Carboplatin i en blodåre i et drop over 1 time.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Samtaler i forbindelse med behandlingen

I forbindelse med 3. serie kemoterapi har du en samtale med lægen, hvor du igen informeres om strålebehandling.

Under strålebehandlingen bliver du ringet op 1 gang om ugen af en læge, og der bliver også taget blodprøver 1 gang om ugen.

2 uger efter strålebehandlingen skal du til samtale med en læge med henblik på at afklare, om du er klar til kemoterapi igen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling, på et af regionens hospitaler inden kl. 9.00.

Book tid til blodprøven på www.booking.RN.dk. Du skal bruge dit NemID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Vigtigt: Tag den forebyggende medicin

Du har fået udleveret forebyggende medicin mod allergisk reaktion og kvalme. Den skal du tage dagen før behandlingen og på behandlingsdagen. Det er vigtigt, at du husker dette.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Hvis du har brug for det, kan du få en parryk eller en kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder**
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Led- og muskelsmerter.** Du kan afhjælpe smerterne med smertestillende medicin.
- **Allergisk reaktion.** Du får forebyggende medicin for at undgå en allergisk reaktion.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Samliv og seksualitet

Din lyst til seksuelt samvær kan mindskes. Det kan være en helt naturlig følge af, at du er i en fysik og psykisk belastende situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og igennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Slimhinderne kan godt blive stive og tørre efter afsluttet behandling. Dette kan afhjælpes med glidecreme og eventuelt en dilatator.

Graviditet

Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel såsom spiral, p-piller eller p-pille-indsprøjtning. Det skal I gøre, mens du får behandling med kemoterapi og op til 6 måneder efter behandlingens ophør. Det skydes risikoen for fosterskader.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer.

Sygemeld dig efter behov

Hvis du arbejder, kan du eventuelt have behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de perioder, hvor du får behandling. Tal med lægen om dit behov.

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet.
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Se skema over behandlingen på næste side.

SKEMA OVER BEHANDLINGEN

Skema over behandlingen før stråleterapi

Skemaet herunder illustrerer de første 3 serier, dvs. de første 9 uger af din behandling. Herefter skal du have 25 strålebehandlinger. Der gives 1 strålebehandling per dag på alle hverdage, men i forbindelse med helligdage kan det forekomme, at du også bliver indkaldt til behandling på disse dage.

”+” i skemaet viser, hvornår du skal have kemoterapi, og hvornår du skal have foretaget undersøgelser.

Behandlingsuge	1. uge	2. uge	3. uge	1. uge	2. uge	3. uge	1. uge	2. uge	3. uge	4. uge	6. – 11. uge
Dato	/			/			/			CT- og MR-skanning inden opstart af strålebehandling	Strålebehandling
Taxol	+			+			+				
Carboplatin	+			+			+				
Samtale ved læge/sygeplejerske	+			+			+				
Blodprøver	+			+			+				

Skema over behandlingen efter stråleterapi

Efter strålebehandlingen skal du have yderligere 3 serier kemoterapi, dvs. 9 ugers behandling igen.

Behandlingsuge	1. uge	2. uge	3. uge	1. uge	2. uge	3. uge	1. uge	2. uge	3. uge
Dato	/			/			/		
Taxol	+			+			+		
Carboplatin	+			+			+		
Samtale ved læge/sygeplejerske	+			+			+		
Blodprøver	+			+			+		