



Kikkertundersøgelse af blæren

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren. Med undersøgelsen kan vi undersøge blærens slimhinde og samtidig kontrollere din blære for polypper, udposninger, fortykkelser, sår eller stendannelser.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden undersøgelsen gives en lindrende gel i urinrøret. Herefter fører vi et tyndt kikkertør op i blæren, og vi fylder blæren med lunkent, sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se den indvendige side af blæren.

Undersøgelsen varer cirka 10-20 minutter, og du får svar på undersøgelsen med det samme.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at vaske dig fornedet om morgenen inden kikkertundersøgelsen. Er du mand, er det vigtigt, at du trækker forhuden tilbage og skyller området grundigt.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du kan have gener efter undersøgelsen

Du kan have svie ved vandladning i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Du kan også opleve blod i urinen. Det er helt normalt og skyldes, at kikkerten kan have lavet små rifter i dit urinrør.

Drik rigeligt med vand

Sandsynligheden for, at du får blærebetændelse, er større end normalt efter undersøgelsen. For at forebygge dette er det vigtigt, at du drikker mindst 2 liter væske resten af døgnet. På den måde får du skyllet blæren godt igennem. Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du kontakte din egen læge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08
Mandag – fredag 8.30 – 12.00

Urologisk Dagafsnit 9

Tlf. 97 66 33 17
Mandag – fredag 8.00 – 18.00

Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 13
Hele døgnet