

Kikkertundersøgelse af endetarmen (anoskopi)

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af den nederste del af din endetarm, også kaldet en anoskopi. Undersøgelsen er nødvendig for at se, om der er forandringer i din endetarm, som kan forklare dine symptomer.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår med et tyndt rør, der føres 5 til 10 centimeter op i din endetarm.

For enden af røret sidder der et kamera, og med det, er det muligt at se slimhinden på indersiden af din endetarm. Det er også muligt at se, om der skulle være sår, polypper, udposninger eller svulster i din endetarm.

Er der synlige hæmorider inde i din tarm, sætter vi elastikker rundt om dem, som får hæmoriderne til at falde af.

Det kan være nødvendigt, at vi puster luft i din tarm i løbet af undersøgelsen, for at vi kan få bedre overblik over området. Når vi puster luften ind i tarmen, kan det trykke i maven og føles ubehageligt.

Undersøgelsen varer cirka 15 minutter.

EFTER UNDERSØGELSEN

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen, inden du tager hjem. Sammen med lægen aftaler du den eventuelle videre behandling.

BIVIRKNINGER VED UNDERSØGELSEN

Anoskopi er en meget sikker undersøgelse. I meget sjældne tilfælde kan der dog opstå blødning fra endetarmen efter undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Ring, hvis du oplever bivirkninger

Hvis du oplever blødning fra din endetarm, efter du er kommet hjem, skal du i hverdage kontakte Kirurgisk Ambulatorium. Efter klokken 15.00 og i weekender skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kirurgisk Dagafsnit Hobro
Tlf. 97 65 26 00
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Kirurgisk Ambulatorium Hobro
Tlf. 97 65 20 80
Mandag – fredag 8.00 – 15.00