



Behandling med Abemaciclib

Du skal i behandling med kræftmedicinen Abemaciclib, også kaldet Verzenios.

Abemaciclib tages i kombination med anti-hormonbehandling, du skal enten have fulvestrant eller en aromataesehæmmer.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Abemaciclib virker ved at hæmme bestemte enzymer, som øger væksten af kræftcellerne.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Abemaciclib er en tabletbehandling, som du skal tage derhjemme. Du skal tage tabletterne morgen og aften i forbindelse med et måltid med 12 timers mellemrum. Tabletterne skal synkes hele, og må ikke knuses, deles eller tygges.

Undlad at drikke grapefrugtjuice

Mens du er i behandling med Abemaciclib, må du ikke drikke grapefrugtjuice, da det kan påvirke den måde, medicinen virker på.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen.

Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Abemaciclib-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

Hvis du tager Abemaciclib med fulvestrant, får du en injektion den første dag i hver serie, det vil sige hver 4. uge, og i den 1. serie vil du få en ekstra injektion med fulvestrant på dag 15.

Hvis du tager Abemaciclib med en aromataesehæmmer, skal du også tage en antihormon-tablet (fx letrozol) hver dag i alle 4 uger.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Kontrol hos os hver 4. uge

Hver 4. uge skal du til en samtale/behandling hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver, og du får udleveret Abemaciclib til den næste periode.

Skanning hver 12. uge

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen. Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hver 14. dag i de første 2 måneder. I de efterfølgende 4 måneder skal du have taget blodprøver ved starten af hver behandlingsserie. Derefter skal der tages blodprøver hver 3 måned eller hyppigere, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:



- **Diarré.** Du kan få diarré. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin, du kan tage ved behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke virker tilstrækkeligt.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Nedsat appetit og smagsforstyrrelser**
- **Træthed**
- **Svimmelhed**

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- vedvarende diarre i over 1 døgn
- ekstrem træthed
- bleg hud og hurtig puls
- temperatur på 38,5 grader eller derover
- åndenød
- svimmelhed og tilfælde af besvimelse

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00