



Behandling med Ribociclib

Du skal i behandling med kræftmedicinen Ribociclib, også kaldet Kisqali.

Ribociclib tages i kombination med anti-hormonbehandling, du skal enten have fulvestrant eller en aromataesehæmmer

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Ribociclib virker ved at hæmme bestemte enzymer, som øger væksten af kræftcellerne.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Ribociclib er en tabletbehandling, som du skal tage derhjemme. Du skal tage tabletterne én gang dagligt og på samme tidspunkt hver dag. Det er ikke nødvendigt at tage tabletterne i forbindelse med et måltid. Tabletterne skal synkes hele med et glas vand, og må ikke knuses, deles eller tygges.

Du må ikke tage tabletten, hvis den er knækket, revnet eller på anden måde er beskadiget.

En behandlingsserie varer 4 uger (28 dage). I de første 3 uger (21 dage), skal du tage Ribociclib hver dag. I den sidste uge (7 dage) skal du ikke tage Ribociclib-tabletterne.

Hvis du tager Ribociclib med fulvestrant, får du en injektion den første dag i hver serie, dvs. hver 4. uge, og i den 1. serie vil du få en ekstra injektion med fulvestrant på dag 15.

Hvis du tager Ribociclib med en aromatasehæmmer, skal du også tage en antihormon-tablet (fx letrozol) hver dag i alle 4 uger, også i den uge, hvor du ikke tager Ribociclib.

Forholdsregler

Mens du er i behandling med Ribociclib, må du ikke spise eller drikke grapefrugt og granatæbler eller juice lavet heraf, da det kan forværre bivirkningerne. Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for soja eller peanuts. Fortæl din læge, hvis du tager for nylig har taget eller måske vil tage andre lægemidler. Herunder vitamintilskud eller andet, da Ribociclib kan påvirke lægemidlets virkemåde.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen.

Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Ribociclib -tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Kontrol hos os hver 4. uge

Hver 4. uge skal du til en samtale hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver, og du får udleveret Ribociclib til den næste periode.

Skanning hver 12. uge

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen. Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable.



SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hver 14. dag i de første 2 måneder. I de efterfølgende 4 måneder skal du have taget blodprøver ved starten af hver behandlingsserie. Derefter skal der tages blodprøver hver 3 måned eller hyppigere, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Få også taget Hjertekardiogram (EKG)

EKG skal tages inden behandlingsopstart, efter 14 dage og før opstart af 2. behandlingsserie.

Bestil tid til EKG på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget prøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Diarré.** Du kan få diarré. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin, du kan tage ved behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke virker tilstrækkeligt.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Hårtab**
- **Træthed**
- **Hovedpine**
- **Væskeophobning i kroppen**
- **Svimmelhed**

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- vedvarende diarre i over 1 døgn
- ekstrem træthed
- bleg hud og hurtig puls
- temperatur på 38,5 grader eller derover
- åndenød
- blødning

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00