



# Kemoterapi med Carboplatin og Etoposid

Du skal i behandling med Carboplatin og Etoposid, som begge er kemoterapi.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Carboplatin og Etoposid er cellegifte, som påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi 3 dage i træk i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- 1. uge dag 1 skal du have både Carboplatin og Etoposid.
- 1. uge dag 2 og dag 3 skal du have Etoposid.
- 2. uge og 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlingsserier du skal have, og hvor ofte du skal skannes.

### På behandlingsdagene

På behandlingsdagene sker følgende:

Dag 1:

- Du bliver vejet.
- Dernæst får du Carboplatin i en blodåre i armen i et drop over 1 time.
- Herefter får du Etoposid i drop over 1-2 timer (afhængig af den dosis, du skal have).

Dag 2 og 3:

- Du får Etoposid i drop over 1-2 timer (afhængig af den dosis, du skal have).

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](http://booking.RN.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Du vil tabe håret, typisk i forbindelse med 2. behandlingsserie. Vi aftaler inden behandlingens start, om du vil have en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Føleforstyrrelser.** Du kan opleve føleforstyrrelser i fingre og tæer. Fortæl os, hvis du oplever føleforstyrrelser.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.



## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00