

# Behandling med Cetuximab og Irinotecan

Du skal i behandling med Cetuximab og Irinotecan.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

### Cetuximab

Cetuximab er et antistof, som påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

### Irinotecan

Irinotecan er et celledræbende kemoterapistof, som påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 2 uger. Behandlingen foregår ambulantly og kræver ikke indlæggelse.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

### På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Inden behandlingen med Cetuximab, får du medicin, som mindsker risikoen for allergisk reaktion.
- Du får Cetuximab i en blodåre i et drop. Den første gang overføres medicinen i løbet af 2 timer – ved de øvrige behandlinger i løbet af 1 time.
- Inden du er færdig med at få Cetuximab, får du en indsprøjtning med atropin, som forebygger bivirkninger ved Irinotecan. Du kan opleve svimmelhed og synsforstyrrelser inden for de første 24 timer efter, du har fået atropin. Derfor bør du ikke køre bil i dette døgn.

- Herefter får du Irinotecan, i en blodåre i løbet af 30 minutter via dropet.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Ved de første behandlinger bliver du observeret nøje af en sygeplejerske, som jævnligt måler dit blodtryk, på grund af risikoen for allergisk reaktion.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](http://booking.RN.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnnet under og efter behandlingen.

- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Hvis du får diarré samme dag, som du har fået behandling, skal du kontakte os. Hvis du får diarré i dagene efter behandlingen, skal du tage stoppende medicin. Vi giver dig medicinen og en vejledning med hjem.
- **Kløende udslæt.** Huden kan få kløende udslæt, eventuelt med væskende sår. Spørg os, hvilken behandling du skal have.
- **Revner i huden.** Du kan få revner i huden ved fingre og negle. Spørg os, hvilken behandling du skal have.
- **Feber.** Hvis du får feber samme dag, som du har fået kemoterapi, er det en reaktion på Cetuximab. Tag eventuelt smertestillende håndkøbsmedicin med paracetamol for at dæmpe feberen.
- **Svedeture og tåreflåd.** Du kan opleve svedeture, og at dine øjne løber i vand i forbindelse med behandlingen. Du får forebyggende medicin mod dette inden behandlingen.
- Diarré, som ikke stopper, selvom du har taget stoppende medicin og fulgt den vejledning, vi har givet dig.

#### Bivirkninger af Cetuximab

- **Allergisk reaktion.** Du får Clemastin i forbindelse med behandlingen for at forebygge en allergisk reaktion.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

#### Aftal at blive hentet af en pårørende efter behandlingen

Sørg for at have en pårørende til at ledsage dig eller køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil det første døgn efter, at du har fået Irinotecan, da du kan opleve svimmelhed og synsforstyrrelser.

#### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine



## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### **Onkologisk Afdeling**

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00