

Kemoterapi med Cisplatin samtidig med strålebehandling

Du skal i behandling med Cisplatin, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Cisplatin er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have strålebehandling dagligt og kemoterapi med Cisplatin 1 gang ugentligt. Du skal have 5 eller 6 serier Cisplatin med 1 uges mellemrum, mens du får strålebehandling. Under behandlingen med kemoterapi er du indlagt.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Først får du 1½ liter væske i en blodåre i et drop over cirka 1½ time. Vi måler din urinmængde undervejs.
- Dernæst får du Cisplatin i en blodåre i et drop over cirka ½ time.
- Til sidst får du 1 liter væske i en blodåre i et drop over cirka 1 time for at skylle nyrerne godt igennem.
- Herefter bliver du vejlet igen. Hvis din vægt er steget med mere end 1 kg i løbet af behandlingen, eller hvis du har symptomer på overvægt, får du tilbudt vanddrivende medicin. Det vurderer en sygeplejerske eller eventuelt en læge.
- Minimum 3 timer efter endt kemoterapi får du dagens strålebehandling.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Du kan tage hjem efter behandlingen, men hvis din vægt er steget meget, skal en læge vurdere din tilstand.

Hvis du har for lavt indhold af kalium i blodet, får du kaleroidtabletter med hjem. Det vurderer lægen ud fra dine blodprøver.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen. Inden behandlingen begynder, skal



du have foretaget en undersøgelse af nyrerne, så vi kan sikre, at deres funktion er i orden.

- **Påvirkning af hørelsen.** Cisplatin kan give hørenedsættelse og tinnitus. Fortæl os, hvis du bliver dårligere til at høre i forbindelse med behandlingen. Hørenedsættelsen kan blive permanent.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.** Cisplatin kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil som oftest forsvinde igen, men kan blive permanente. Fortæl os, hvis du oplever begyndende symptomer.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme i forhold til både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00