



# Behandling med Dulcolax®

Du skal have Dulcolax®, som virker mod forstoppelse. Dulcolax® kan også bruges til at tømme tarmen forud for operation eller undersøgelse af tarmen.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Dulcolax® fremmer tarmens naturlige bevægelser. Det virksomme stof i Dulcolax® hedder bisacodyl.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Dulcolax® findes som tabletter og stikpiller:

- Tabletterne skal synkes med vand og virker efter 6-12 timer. Tabletterne skal opbevares ved stuetemperatur.
- Stikpillerne skal føres op i endetarmen og virker efter 5-20 minutter. Stikpillerne skal opbevares i køleskab.

Du skal tage den dosis Dulcolax®, som vi har aftalt.

### Drik rigeligt

Du skal drikke rigeligt i forbindelse med behandlingen, da medicinen bruger vandet i din krop til at gøre afføringen blødere.

### Tag ikke Dulcolax® ved disse tilstande

Du må ikke tage Dulcolax®, hvis du har betændelse eller forsnævring i tarmen.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- Diarré ved overdosering
- Rumlen i maven

- Forbigående smerter, da tarmen begynder at arbejde.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00