



Behandling af gynækologisk sygdom med Hycamtin®

Du skal behandles for din gynækologiske kræftsygdom med Hycamtin®, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Hycamtin® er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 4 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- Uge 1 (dag 1) får du Hycamtin®.
- Uge 2 (dag 8) får du Hycamtin®.
- Uge 3 (dag 15) får du Hycamtin®.
- Uge 4 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

Efter 3. behandlingsserie skal du have lavet en CT-skanning, så vi kan vurdere effekten af behandling.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Du får Hycamtin® i en blodåre i et drop over 30 minutter.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på <https://booking.RN.dk>. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Diarré.** Hvis du har minimum 4 tynde afføringer på 1 dag, har du diarré. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 kapsler Propiden® hver 2. time, indtil der er gået 12 timer, hvor du ikke har haft diarré. Vi udleverer Propiden® til dig.
- **Forstoppelse.** Forstoppelse kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Mavesmerter**
- **Udslæt på huden.**



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00