



Behandling med Medrol®

Du skal i behandling med Medrol®. Medrol® mindsker forhøjet tryk i hjernen, som kan opstå i forbindelse med sygdom i hjernen og strålebehandling af hjernen.

Symptomerne på forhøjet tryk i hjernen kan være:

- hovedpine
- kvalme eller opkastning
- synsforstyrrelser
- krampe.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Ved sygdom i hjernen og som følge af strålebehandling af hjernen kan der opstå irritation og væskedannelse i hjernen. Medrol® mindsker dette og afhjælper dermed symptomerne.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal tage Medrol® som tabletter dagligt. Vi aftaler med dig, hvor længe du skal tage medicinen.

Du må ikke knuse tabletterne, men skal synke dem hele.

Du skal opbevare tabletterne ved stuetemperatur.

Sådan forholder du dig, hvis:

- **du glemmer at tage Medrol®:** Tag medicinen, så snart du kommer i tanke om, at du har glemt det. Vent derefter 24 timer med at tage næste dosis medicin.
- **du ikke husker, om du har taget Medrol®:** Tag aldrig dobbelt dosis. Vent til næste dag, og tag medicinen, som du plejer.

- **du kaster op:** Hvis du kaster op, efter du har taget Medrol®, skal du vente til næste dag med at tage den næste dosis.
- **du har taget for meget Medrol®:** Kontakt os straks, hvis du har taget for meget Medrol®.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Let indre uro og søvnbesvær.** Det er bedst at tage medicinen om morgenen for at undgå søvnbesvær.
- **Sviende og brændende fornemmelse i maven.** Du kan få medicin for at lindre generne.
- **Øget ophobning af fedt i ansigtet, såkaldt måneansigt**
- **Risiko for udvikling af sukkersyge**
- **Knogleskørhed**
- **Tynd og sart hud.**

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Mandag – fredag 8.00 – 15.00