



Kemoterapi med oxaliplatin, Leucovorin og 5 FU givet på pumpe over 46 timer

Du skal i behandling med oxaliplatin, Leucovorin og 5 FU.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Oxaliplatin

Oxaliplatin er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

5 FU

5 FU er cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

Leucovorin

Leucovorin er et B-vitamin (folinsyre), som forstærker virkningen af 5 FU.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 2 uger. Behandlingen foregår ambulantly og kræver ikke indlæggelse.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

- På behandlingsdag 1 i den 1. uge får du oxaliplatin, Leucovorin og 5 FU.
- I den 2. uge holder du pause med behandlingen.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Du får oxaliplatin og Leucovorin samtidig i en blodåre i et drop over 2 timer. Du får medicinen i din veneport.

- Herefter får du 5 FU i en blodåre i et drop over 3-5 minutter.
- Til slut forbinder vi en medicinpumpe til din veneport. Medicinpumpen indeholder 5 FU, som du skal have kontinuerligt i de næste 46 timer. I de 46 timer skal du være hjemme, og du skal bære pumpen i et bælte.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.
- Efter de 46 timer skal pumpen frakobles. Det kan foregå i Onkologisk Dagafsnit, eller det kan efter aftale foregå i dit eget hjem, hos din egen læge eller på et andet sygehus.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Irritation af øjne.** Slimhinderne i øjnene kan blive irriterede, og du kan opleve, at øjnene løber i vand. Du kan eventuelt afhjælpe generne med kunstig tårevæske, som vi kan give dig ved behov.

- **Betændelse i munden.** Slimhinderne i munden kan også blive irriterede, og du kan få betændelse i munden. Du kan forebygge irritation og betændelse ved at børste tænder jævnligt og lindre generne ved at skylle munden i kamillete. Hvis det ikke hjælper, kan det blive nødvendigt at behandle betændelsen med medicin.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Irritation af huden.** Huden kan blive rød, tør og sviende, særligt i håndflader og på fodsåler. Du kan til en vis grad forebygge generne ved at smøre huden med en fed creme allerede fra begyndelsen af behandlingen.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Forstoppelse.** Forstoppelse kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Diarré.** Du kan få diarré, det vil sige minimum 4 tynde afføringer på 1 dag. Du kan afhjælpe diarréen ved at tage 2 styk tablet Imodium® ved første diarré, herefter 1 styk hver 2. time, indtil der er gået 12 timer, hvor du ikke har haft diarré. Kontakt os, hvis du har diarré i mere end 24 timer. Husk at drikke rigeligt med væske, cirka 2 liter i døgnet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine
- Diarré, som ikke stopper, selvom du har taget stoppende medicin og fulgt den vejledning, vi har givet dig.

KONTROL

Når du har fået de planlagte kemobehandlinger, henviser vi dig tilbage til Mave-tarmkirurgisk Afdeling, som fremover vil indkalde dig til kontrol.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00