



# Kemoterapi med Taxol og Carboplatin

Du skal i behandling med Taxol og Carboplatin, som begge er kemoterapi.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

### Taxol

Taxol er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst. Taxol er et stof, der stammer fra barken på takstræ. Det er et plantestof, som kan give allergiske reaktioner.

### Carboplatin

Carboplatin er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulantly og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du både Carboplatin og Taxol.
- I uge 2 og 3 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have. Du skal efter hver 3. behandlingsserie have lavet en skanning, så vi kan vurdere effekten af behandlingen.

### På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Din vægt registreres
- Derefter får du Taxol i en blodåre i et drop over cirka 3 timer.
- Til slut får du Carboplatin i en blodåre i et drop over 1 time.

- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling, på et af regionens hospitaler inden kl. 9.00.

Book tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

### Vigtigt: Tag den forebyggende medicin

Du har fået udleveret forebyggende medicin mod allergisk reaktion og kvalme. Den skal du tage dagen før behandlingen og på behandlingsdagen. Det er vigtigt, at du husker dette .

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder**
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.



- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Led- og muskelsmerter.** Du kan afhjælpe smerterne med smertestillende medicin.
- **Allergisk reaktion.** Du får forebyggende medicin for at undgå en allergisk reaktion.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00