



Behandling med Tamoxifen

Du skal i behandling med Tamoxifen, som er et antihormon. Tamoxifen anvendes mod visse former for brystkræft og kræft i æggestokkene.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Tamoxifen virker ved at blokere for det kvindelige kønshormon, som kræftcellerne lever af.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal tage Tamoxifen som tablet 1 gang dagligt.

Du skal opbevare Tamoxifen ved stuetemperatur.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Kvalme.** Du kan eventuelt afhjælpe kvalme ved at tage tabletten, når du går i seng.
- **Mundtørhed.**
- **Vægtøgning.** Din kropsvægt kan stige på grund af væskeophobning.
- **Tørhed i skeden.** Tørhed kan afhjælpes med glidecreme eller hormonstikpiller i skeden.
- **Let blødning fra skeden.**
- **Hedeture.**

Tamoxifen kan forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00