



Behandling af kræft i underlivet med Provera®

Du skal i behandling med Provera® mod kræft i underlivet. Provera® er ikke kemoterapi, men et kønshormon.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Provera® påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have medicinen i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 måneder. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

Du skal tage tablet Provera® á 250 mg 2 gange dagligt i 1 måned. Herefter kommer du til samtale på hospitalet, så vi kan vurdere, om du tåler behandlingen. Efterfølgende skal du tage 1 tablet dagligt.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have. Efter hver 3. måned skal du have lavet en CT-skanning, så vi kan vurdere effekten af din behandling.

Sådan tager du medicinen

Du skal synke tabletterne hele med et glas vand. Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du springe den over.

Du skal opbevare Provera® ved stuetemperatur.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- Let vægtøgning på grund af væskeophobning
- Hævede ben på grund af væskeophobning
- Hovedpine på grund af væskeophobning
- Blodtryksstigning.

Provera® kan nedsætte effekten af tabletter mod sukkersyge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00