

Kemoterapi med **Xeloda[®]** samtidig med strålebehandling

Du skal i behandling med Xeloda[®], som er kemoterapi, samtidig med at du er i strålebehandling.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Xeloda[®] er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

Strålebehandling har til formål at ødelægge kræftvævet samtidig med, at det normale væv og organerne fortsat fungerer. Når du er i strålebehandling, påvirker strålingen både kræftvæv og normalt væv, men normalt væv kan bedre reparere disse skader end kræftvævet.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Strålebehandling

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger med stråler du skal have.

Kemoterapi

De dage, hvor du får strålebehandling, skal du tage Xeloda[®] som tabletter.

Du skal tage tabletterne 2 gange om dagen. Du skal synke dem hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 minutter efter måltidet.

Hvis du glemmer at tage dine tabletter, eller hvis du kaster dem op, skal du ikke tage en ny dosis som erstatning.

Vi udleverer tabletterne til dig i Onkologisk Dagafsnit.

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit

sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Så længe du får strålebehandling, skal du have taget blodprøver hver uge. Du får tidspunktet at vide, når vi udleverer Xeloda[®]-tabletterne til dig.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.
- **Rød og irriteret hud.** Du kan få rød og irriteret hud på håndflader og fodsåler. På de steder, hvor du får strålebehandling, kan huden reagere som ved solskoldning.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Irriteret slimhinde i munden.** Slimhinden i munden kan blive rød og irriteret. Du kan forebygge irritation ved at børste tænder jævnlige, og du kan lindre generne ved at skylle munden i kamillete.
- **Gener fra blæren**
- **Smerter i benene.**



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Dagafsnit
Tlf. 97 66 14 00