

Behandling med Tucatinib i kombination med Trastuzumab og Capecitabin

Du skal i behandling med kræftmedicinen Tucatinib, også kaldet Tukysa. Det gives i kombination med Trastuzumab og Capecitabin.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Tucatinib blokerer HER2-receptorerne på kræftceller. HER2 danner signaler, som kan hjælpe kræften med at vokse. Hvis det blokeres, kan det forsinke kræftcellerne i at vokse eller måske slå dem helt ihjel. I kombination med Trastuzumab forstærkes kræftcellernes død.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Tucatinib gives sammen med et kemostof, cabecitabine, samt antistoffet trastuzumab i en 3 ugers cyklus.

Trastuzumab gives i et drop i en blodåre på dag 1. I denne forbindelse udleveres de 2 typer tabletter.

Tucatinib er en tabletbehandling, som du skal tage derhjemme. Du skal tage tabletterne 2 gange dagligt i alle 3 uger. Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage.

Du skal tage Capecitabin 2 gange daglig i 14 dage, hvorefter du skal holde 1 uges pause.

Tucatinib skal tages på samme tidspunkt hver dag og med omtrent 12 timers mellemrum. Tucatinib kan tages på samme tidspunkt som Capecitabin. Tabletterne skal synkes hele med eller uden mad. Du må ikke tygge, knuse eller dele tabletterne.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis
Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med

behandlingen. Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Tucatinib-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Behandling

Du skal til behandling hos os hver 3. uge. Vi kontrollerer dine blodprøver, og du får udleveret medicin til den næste periode. Du skal være opmærksom på, at du skal have taget blodprøver ved hver behandling.

Skanning hver 9. uge

Hver 9. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen. Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable. Du får svar på din skanning i forbindelse med samtale hver 9. uge.

Du vil desuden få foretaget en hjerteskaning hver 12. uge.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver før behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.



BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- Diarré
- Kvalme
- Påvirket levertal
- Ømhed i mundslimhinden
- Blødning fra slimhinder
- Udslæt
- Ledsmerter.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Du får blå mærker eller blødning fra sår, som varer længere end normalt.
- Du er forpustet, føler dig meget træt, er bleg i huden eller har en hurtig hjerterytme.
- Du har temperatur på 38,5 grader eller derover.
- Diarré i mere end 1 døgn trods Imodium®.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00