



Kemoterapi med Vectibix

Du skal i behandling med Vectibix, også kaldet panitumumab, som er et antistof.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Vectibix er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 2 uger.

- På 1. behandlingsdag får du Vectibix. Behandlingen gives eventuelt sammen med andre stoffer.
- I uge 2 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have. Behandlingen foregår ambulantly og kræver ikke indlæggelse.

På behandlingsdagen

- Du bliver vejlet.
- Du får Vectibix i et drop i en blodåre over 60 minutter i 1. behandlingsserie, og over 30 minutter i 2. behandlingsserie og de efterfølgende serier.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Bliv CT-skannet

Inden du begynder på behandlingen, skal du have foretaget en CT-skanning. Du skal skannes tidligst 4 uger før behandlingens start. Skanningen bruger vi som udgangspunkt for at evaluere, om behandlingen har effekt. Du skal have lavet en ny skanning, når du har fået 3 behandlingsserier. Du vil blive indkaldt til CT-skanningen.

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Medbring en urinprøve

Medbring en urinprøve, når du kommer til behandling. Vi undersøger urinprøven for protein.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandling.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, således at dit immunforsvar kan blive svækket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Udslæt på huden.** En hyppig bivirkning er udslæt, som kan sammenlignes med bumser. Udslættet ses ofte allerede efter første behandling og forekommer hyppigt i ansigtet, hovedbunden og nakken samt på armene og ryggen. Hvis du får udslæt, behandler vi det med antibiotika, og du kan med fordel smøre det med en fed, uparfumeret creme. I svære tilfælde kan vi nedsætte dosis af Vectibix.
- **Neglerodsbetændelse.** Dine neglerødder kan revne, så der opstår betændelse i dem.
- **Lavt niveau af magnesium i kroppen.** Vectibix kan forårsage et fald i mængden af magnesium i dit blod. Vi kontrollerer dit magnesiumniveau, når



du får taget blodprøver. Det kan være nødvendigt at behandle dig med magnesiumtilskud.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38,5 grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion i slimhinder fx tandkød eller endetarm
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00