



Undersøgelse af, om du har behov for endnu en behandling med radioaktivt jod

Tracer-undersøgelse

Du har efter din første behandling med radioaktivt jod fået lavet en jodscintigrafi. Den har vist, at der fortsat er en rest af skjoldbruskkirtelvæv.

Det er helt normalt på nuværende tidspunkt i dit behandlingsforløb. Det betyder ikke, at du aktuelt har kræft.

Ud fra scintigrafien er det aktuelt ikke muligt at afgøre, om du skal have flere behandlinger med radioaktivt jod. Det vil vi derfor afgøre ud fra undersøgelsen, som er beskrevet herunder.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du har fået udleveret stoffet Thyrogen®. Stoffet skal bruges ved en indsprøjtning, som hjemmesygeplejersken giver dig.

Du skal opbevare Thyrogen® i køleskabet. Det er ikke farligt at have Thyrogen® i køleskabet. Det påvirker ikke dine mad- og drikkevarer.

10 dage før første indsprøjtning _____ skal du undgå mad- og drikkevarer med jod – præcis som du gjorde i forbindelse med din jodbehandling.

Du må spise og drikke jodholdige produkter igen, efter at du har fået lavet en ny jodscintigrafi (se datoen her i beskrivelsen).

_____ dag den _____ mellem klokken 10 og 14 skal du have en indsprøjtning med Thyrogen®. Hjemmesygeplejersken giver dig indsprøjtningen i din ene balde.

_____ dag den _____ skal du møde på **Onkologisk Sengeafsnit D1**.

Her vil du få endnu en indsprøjtning med Thyrogen®

Husk at medbringe det andet glas med Thyrogen®.

Efterfølgende får du en lille dosis radioaktivt jod. Denne dosis er så lille, at du ikke skal være isoleret.

Herefter skal du have taget en blodprøve her på hospitalet kl. 9.45. Du skal selv booke en tid til blodprøven på www.booking.rn.dk Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Du må gå hjem herefter

_____ dag den _____ klokken _____ skal du møde på Nuklearmedicinsk Afdeling. Her får du lavet en jodscintigrafi. Når du har fået lavet jodscintigrafien, kan du gå hjem.

Når vi får svar på dine blodprøver og din jodscintigrafi, kan vi vurdere, hvad der skal ske.

Der er 3 mulige udfald:

1. Du er færdigbehandlet med radioaktivt jod og overgår til kontrolforløb en gang om året.
2. Du skal have endnu en jodbehandling. Den vil du blive indkaldt til cirka 2 måneder efter denne undersøgelse. Jodbehandling vil foregå præcis som den jodbehandling, du har fået tidligere. Du skal komme og få udleveret Thyrogen®, og hjemmesygeplejersken giver dig to indsprøjtninger forud for behandlingen.
3. Det er ikke muligt for os at afgøre, om du har behov for yderligere jodbehandling. Vi vil lave en blodprøvekontrol 3-4 måneder efter denne undersøgelse, og derefter vil du få svar på, om du overgår til kontrolforløb eller skal have endnu en jodbehandling.



SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Fortæl os, hvordan du ønsker at få svar undersøgelsen. Du har disse muligheder:

- via videoapp
- per telefon
- per e-Boks/brev
- ved ambulant fremmøde.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personalet på Onkologisk Afdeling.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 15 46



Forbehandling med Thyrogen® - inden undersøgelse af, om du har behov for endnu en behandling med radioaktivt jod

Navn: _____

Du har fået en indkaldelse til undersøgelse af, om du har behov for endnu en behandling med radioaktivt jod, og i den forbindelse skal du have Thyrogen®.

Den anbefalede dosering af Thyrogen® er 2 doser. Den første dosis skal du have cirka 48 timer, før du får den radioaktive jod i forbindelse med undersøgelsen, og den anden dosis lige umiddelbart før.

Opbevar Thyrogen® på køl

Du skal opbevare Thyrogen® i køleskabet. Det er ikke farligt at have Thyrogen® i køleskabet. Det påvirker ikke dine fødevarer.

Hjemmesygeplejersken giver dig første indsprøjtning

Det er en hjemmesygeplejerske, der giver dig Thyrogen® 48 timer før, du skal have kapslen (I-131) med den radioaktive jod.

Hjemmesygeplejersken ringer til dig og aftaler nærmere.

Personalet på Afdeling D1 giver dig den anden indsprøjtning med Thyrogen®, umiddelbart inden du får det radioaktive jod.

Medbring skemaet til behandlingen

Når hjemmesygeplejersken kommer og giver indsprøjtningen, skal dato og klokkeslæt noteres i skemaet herunder. Du skal medbringe skemaet, når du kommer til undersøgelsen, så vi kan se, hvornår du har fået Thyrogen®.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 15 46

SKEMA TIL HJEMMESYGEPELEJERSKE

Udfyldes af Onkologisk Ambulatorium		Udfyldes af hjemmesygeplejersken		
	Dato	Klokkeslæt	Dato og klokkeslæt for injektion	Initialer
48 timer		Kl. 12 +/- 2 timer		
0 timer		Kl. 12 +/- 2 timer		
I-131 kapsel		Kl. 12 +/- 2 timer		

Information til læger og andet sundhedspersonale

Den anbefalede dosis Thyrogen® er 2 indsprøjtninger i muskelen med 0,9 mg thyrotropin alfa administreret med 24 timers interval.

Anvend aseptisk teknik

- Tilsæt 1,2 ml vand til injektion til Thyrogen®-pulveret i hætteglasset.
- Hætteglassets indhold hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt materialet er opløst. Opløsningen må ikke rystes. Når pulveret er opløst, er den samlede volumen i hætteglasset 1,2 ml. pH-værdien af Thyrogen-opløsningen er cirka 7,0.
- Kontrollér visuelt Thyrogen®-opløsningen i hætteglasset for fremmedlegemer og misfarvning. Thyrogen®-opløsningen bør være en klar, farveløs væske. Hætteglas med fremmedlegemer, uklarheder eller misfarvning må ikke anvendes.
- Udtag 1,0 ml af Thyrogen®-opløsningen fra hætteglasset. Dette svarer til 0,9 mg thyrotropin alfa, der skal injiceres.
- Efter opblanding skal opløsningen injiceres inden for 3 timer, selvom Thyrogen®-opløsningen forbliver kemisk stabil i op til 24 timer ved opbevaring mellem 2 °C og 8 °C beskyttet mod lys. Det er vigtigt at bemærke, at den mikrobiologiske sikkerhed afhænger af de aseptiske forhold under tilberedningen af opløsningen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Thyrogen® indeholder ingen konserveringsmidler. Eventuel ikke anvendt opløsning skal derfor omgående kasseres.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Du kan læse mere om Thyrogen® på www.indlaegssedler.dk. Søg på Thyrogen®.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 15 46