



Forebyggelse af kvalme med Akynzeo

Du skal tage Akynzeo for at forebygge kvalme og opkastning, som kan opstå efter din medicinske kræftbehandling.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Akynzeo blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der kan give kvalme og opkastning.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Akynzeo findes i en blisterpakke med 1 kapsel. Kapslen skal synkes hel med 1 glas vand. Kapslen må ikke skilles ad. Du skal tage kapslen 1 time før du skal have kemoterapi.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Hovedpine**
- **Træthed**
- **Forstoppelse.** Du kan afhjælpe forstoppelse ved at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt tage afføringsmiddel.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Sådan opbevarer du medicinen

Kapslen skal opbevares ved stuetemperatur. Den skal opbevares i den originale blisterpakke for at beskytte den mod fugt.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00