



# Forebyggelse af kvalme med Palonosetron

Du skal tage Palonosetron for at forebygge kvalme og opkastning, som kan opstå efter din medicinske kræftbehandling.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN.

Palonosetron blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der kan give kvalme og opkastning.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Palonosetron findes både som kapsler og som injektionsvæske, det vil sige væske, der gives i et drop via en blodåre i armen.

Kapslen skal synkes hel med 1 glas vand. Kapslen må ikke skilles ad. Du skal tage kapslen 1 time før du skal have kemoterapi.

Hvis du skal have medicinen som væske, får du den ind i blodåren i forbindelse med din medicinske kræftbehandling.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Hovedpine**
- **Diarré**
- **Svimmelhed**
- **Forstoppelse.** Du kan afhjælpe forstoppelse ved at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt tage afføringsmiddel.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Sådan opbevarer du medicinen

Tabletterne opbevares ved stuetemperatur.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00