



Forebyggelse af kvalme og opkastning med Domperidon

Du skal have medicinen Domperidon for at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med din kræftbehandling.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Domperidon blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning. Desuden virker Domperidon stimulerende på tarmfunktionen, så mavesækken tømmes hurtigere.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Domperidon findes som tabletter. Tabletterne skal synkes med vand og virker efter ½ time.

Du skal tage den dosis Domperidon, som vi har aftalt. Du kan afhjælpe kvalme i forbindelse med måltider ved at tage Domperidon ½ time før et måltid.

BIVIRKNINGER

- Mundtørhed.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Sådan opbevarer du medicinen

Tabletterne opbevares ved stuetemperatur.

Tabletterne skal opbevares i den originale emballage.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00