



Behandling med Lorviqua

Du skal i behandling med kræftmedicinen Lorviqua, også kaldet Lorlatinib.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Lorviqua virker ved at hæmme aktiviteten af proteinet ALK, der findes på celleoverfladen i mange kræftceller. Proteinet medvirker til, at kræftcellerne kan vokse ukontrolleret og spredes. Lorviqua skal modvirke denne spredning.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Lorviqua er en tabletbehandling, som tages hjemme. Du skal tage 1 tablet dagligt omkring samme tid hver dag. Tabletten sluges hel med mindst 2,5 dl vand. Kan tages i forbindelse med et måltid. Må ikke indtages med grapefrugt og grapefrugtjuice.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen. Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Lorviqua-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Kontrol hos os hver 4. uge

Hver 4. uge skal du til en samtale hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver, og du får udleveret Lorviqua til den næste periode.

Skanning hver 12. uge

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en CT-skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen.

Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver og EKG før hver kontrol

Du skal have taget blodprøver og EKG hverdagen før hver kontrol. Blodprøverne og EKG skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven og EKG på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk).

Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøve og EKG.

Medbring en urinprøve

Du skal medbringe en urinprøve til hver behandling.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Forhøjet kolesteroltal.**
- **Diarré.** Du kan få diarré. Du må maksimalt have 4 vandtynde afføringer per dag. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 tabletter loperamid ved første diarré, herefter 1 tablet ved hver diarré. Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet. Hvis der går mere end 24 timer, inden diarréen stopper, skal du kontakte os. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Udslæt på huden.** En hyppig bivirkning er udslæt. Du kan med fordel smøre udslættet med en fed, parfumeret creme.
- **Synsforstyrrelser.**
- **Hallucinationer.**



- **Humørforstyrrelser.**
- **Susen for ørene (tinnitus).**
- **Kvalme og evt opkastning.**
- **Muskelsmerter.**
- **Vægtøgning og væskeophobning.**
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.**
- **Tale og hukommelsesbesvær.**
- **Forstoppelse.**
- **Lungeirritation (pneumonitis).** Irritation af lungerne forekommer i sjældne tilfælde og mærkes som pludselig åndenød ledsaget af hoste eller feber. Hvis du får disse symptomer, skal du ringe til os.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- Diarré, som ikke stopper trods stoppende medicin
- Voldsomt udslæt
- Hallucinationer
- Feber på 38,5 grader eller derover
- Forværring i åndenød
- Svimmelhed og tilfælde af besvimelse
- Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00