



Behandling med Xalkori

Du skal i behandling med kræftmedicinen Xalkori, også kaldet crizotinib.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Xalkori virker ved at hæmme aktiviteten af proteinet ALK, der findes på celleoverfladen i mange kræftceller.

Proteinet medvirker til, at kræftcellerne kan vokse ukontrolleret og spredes. Xalkori skal modvirke denne spredning.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Xalkori er en tabletbehandling, som du skal tage hjemme. Du skal tage tabletterne morgen og aften, sammen med et glas vand. Xalkori må ikke indtages med grapefrugt.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen. Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Xalkori-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Kontrol hos os hver 4. uge

Hver 4. uge skal du til en samtale hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver, og du får udleveret Xalkori til den næste periode.

Skanning hver 12. uge

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen.

Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver kontrol. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Få taget EKG før 1. behandling og ved hver skanning

Du skal have taget EKG hverdagen før 1. behandling og herefter ved hver skanning. Du kan få taget EKG, når du alligevel får taget blodprøver og også bestille tid samtidig.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Diarré.** Du kan få diarré. Du må maksimalt have 4 vandtynde afføringer per dag. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 tabletter loperamid ved første diarré, herefter 1 tablet ved hver diarré. Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet. Hvis der går mere end 24 timer, inden diarréen stopper, skal du kontakte os. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Hududslæt.** En hyppig bivirkning er udslæt. Du kan med fordel smøre udslættet med en fed, uparfumeret creme.



- **Synsforstyrrelser.**
- **Kvalme og evt opkastning.**
- **Påvirkning af leverfunktionen.**
- **Smagsforandringer.**
- **Væskeophobning.**
- **Træthed.**
- **Svimmelhed.**
- **Lungeirritation (pneumonitis).**
- **Irritation af lungerne.** Forekommer i sjældne tilfælde og mærkes som pludselig åndenød ledsaget af hoste eller feber. Hvis du får disse symptomer, skal du ringe til os.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- Diarré, som ikke stopper trods stoppende medicin
- Voldsomt udslæt
- Feber på 38,5 grader eller derover
- Forværring i åndenød
- Svimmelhed og tilfælde af besvimelse
- Blødning.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00