



# Behandling med Trastuzumabemtansin

Du skal i behandling med Trastuzumabemtansin, også kaldet Kadcyla, som er en kombination af et antistof og et kemostof.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Trastuzumabemtansin hæmmer vækst af eventuelle kræftceller ved at binde sig til HER2 (HER2 findes på overfladen af nogle kræftceller og stimulerer deres vækst). Når Trastuzumabemtansin binder sig til HER2, kan det stoppe væksten af kræftcellerne og forårsage celledød.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier.

Hver serie strækker sig over 3 uger. Det foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Trastuzumabemtansin
- I den 2. og 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

## PÅ BEHANDLINGSDAGEN

- Du får målt dit blodtryk.
- Du får Trastuzumabemtansin i et drop i en blodåre over 90 minutter ved 1. behandlingsserie, herefter over 30 minutter.
- Du vil efter behandlingen blive observeret over 90 minutter ved 1. behandlingsserie, herefter over 30 minutter.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen. Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Opkastning**
- **Diarre**
- **Forstoppelse**
- **Feber**
- **Træthed**
- **Blærebetændelse**
- **Hovedpine**
- **Påvirkning af leveren.** Kan give en betændelsesligende reaktion i leveren eller beskadige leverceller. I de fleste tilfælde er der ingen symptomer.
- **Blødning.** Nogle patienter oplever uventede blå mærker og blødning (fx næseblod). Dette kan være tegn på nedsat antal blodplader.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.** Kan opleves som smerter, kløe, snurrende, prikkende eller stikkende fornemmelse i hænder og fødder.
- **Hjerteproblemer.** Kan opleves som hoste eller åndenød. Brystsmerter og hævede ankler og arme, følelse eller uregelmæssige hjerteslag.



- **Infusionsrelateret reaktion.** Du kan opleve ansigtsrødme, kulderystelser, feber, åndedrætsbesvær, lavt blodtryk eller hurtig puls.

### VÆR OPMÆRKSOM PÅ

#### Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover.
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder.
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx tandkød eller endetarm.
- Ved hjerteproblemer

### KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



#### Kontakt

##### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00