



Behandling med Pertuzumab

Du skal i behandling med Pertuzumab, også kaldet Perjeta, som er et antistof.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Pertuzumab hæmmer vækst af kræftknuden ved at binde sig til HER2 (HER2 findes på overfladen af nogle kræftceller og stimulere deres vækst) Når Pertuzumab binder sig til HER2, kan det stoppe væksten af kræftcellerne og forårsage celledød.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier.
Hver serie strækker sig over 3 uger. Det foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Pertuzumab
- Behandlingen gives sammen med andre stoffer.
- I den 2. og 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

PÅ BEHANDLINGSDAGEN

- Du får målt dit blodtryk.
- Du får Pertuzumab i et drop i en blodåre over 60 minutter ved 1. behandlingsserie, herefter over 30 minutter.
- Du vil efter behandlingen blive observeret over 60 minutter ved 1. behandlingsserie, herefter over 30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen
Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Kvalme og eller opkastning**
- **Smagsændringer**
- **hårtab**
- **Halsbrand**
- **søvnløshed**
- **Diarre**
- **Forstoppelse**
- **Feber**
- **Træthed**
- **Hjerteproblemer**
- **Influenzalignende symptomer**
- **Udslæt, tør og kløende hud**
- **Påvirkning af leveren.** Kan give en betændelsesligende reaktion i leveren eller beskadige leverceller. I de fleste tilfælde er der ingen symptomer.
- **Blødning.** Nogle patienter oplever uventede blå mærker og blødning (fx næseblod). Dette kan være tegn på nedsat antal blodplader.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.** Kan opleves som smerter, kløe, snurrende, prikkende eller stikkende fornemmelse i hænder og fødder.



- **Hævede ankler og arme**
- **Infusionsrelateret reaktion.** Du kan opleve ansigtsrødme, kulderystelser, feber, åndedrætsbesvær, lavt blodtryk eller hurtig puls.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover.
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder.
- Hoste eller åndenød

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00