



Undersøgelse af pludseligt fald i blodtrykket ved stillingskift (ortostatisk blodtryk)

Hvis blodtrykket falder meget fra liggende til stående stilling, oplever nogle mennesker svimmelhed eller besvimelse. Det pludselige fald i blodtrykket fra liggende til stående stilling kaldes også for det ortostatiske blodtryk.

Du skal have målt dit ortostatiske blodtryk. Formålet er at undersøge, om der sker et u hensigtsmæssigt stort fald i blodtrykket, når du rejser dig hurtigt op efter at have hvilet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen begynder med, at du skal ligge ned og slappe af i 10 minutter. Derefter får du sat en blodtryksmanchet omkring din overarm, og du får målt puls og blodtryk i hvile, og igen når du rejser dig. Nogle patienter oplever svimmelhed, lige når de har rejst sig.

Herefter skal du stå afslappet og uden støtte, og du vil få målt puls og blodtryk hvert minut i de næste 7 minutter. Sygeplejersken registrerer målingerne i et skema. Du må ikke tale i de 7 minutter.

Når tiden er gået, må du tage hjem.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Der er ingen forberedelser til undersøgelsen. Du må tage din medicin, som du plejer.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar på undersøgelsen umiddelbart efter eller ved næste lægebesøg i dit forløb hos os.

RISIKO

Der er ingen risiko forbundet med undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium, Hobro
Tlf. 97 65 24 30
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00