

Sådan tager du en afføringsprøve til måling af calprotectin

Du skal tage en afføringsprøve, så vi kan undersøge indholdet af calprotectin i din afføring.

Calprotectin er et protein, som findes i blod, urin og afføring hos alle mennesker. Ved inflammatoriske tarmsygdomme (kronisk betændelsestilstand i tarmen) stiger indholdet af calprotectin oftest kraftigt i afføringen. Vi bruger undersøgelsen til at finde årsager til diarré, og for at se, om der er aktivitet i en inflammatorisk tarmsygdom.

Du har fået et prøvesæt, som indeholder:

- et gråt hylster, som indeholder rør til forsendelse af prøven
- en laboratoriehenvielse
- en frankeret kuvert, som du skal bruge til at sende prøven retur til Klinisk Biokemisk Afdeling.

- Læg prøveglasset i det grå hylster og skru låget godt fast.
- Læg prøveglas og følgeseddel i boblekuverten.
- Aflever prøven i en postbutik eller på posthuset, umiddelbart efter du har taget prøven.



Eksempel på en følgeseddel

SÅDAN GØR DU

Opsaml afføringsprøven

- Undgå at tage prøven op til en weekend eller en helligdag. Tag helst prøven om morgenen.
- Start med at lade vandet, så der ikke bliver blandet urin i prøven.
- Opsaml afføringen ved hjælp af vedlagte Easy Sampler.
- På prøveglassets låg sidder en lille ske. Brug skeen til at fylde en klump afføring på størrelse med en hasselnød over i prøveglasset.

Send afføringsprøven

- Sørg for, at der står navn og CPR-nummer på prøveglasset og på følgesedlen. Tag den selvklebende strejkode af følgesedlen og sæt den på langs på det inderste glas.
- Skriv dato for opsamling af afføringsprøven på følgesedlen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Dagafsnit Farsø
Tlf. 97 65 31 10
Mandag – fredag 8.00 – 15.00