

Tapning af væske fra bughulen

Du skal have tappet væske (ascites) fra din bughule. Behandlingen kaldes også ascitespunktur/drænage.

Behandlingen kan have 2 formål:

- At tappe overskydende væske fra bughulen
- At tappe væske fra bughulen til yderligere undersøgelse

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Du mister en del æggehvidestof (albumin), når du får tappet væske fra bughulen. I forbindelse med tapningen giver vi dig derfor et drop med albumin.

Behandlingen begynder med, at du bliver lokalbedøvet i huden over det sted, hvor drænet skal ligge. Det vil som oftest være i den nederste venstre del af maven. På grund af lokalbedøvelsen vil du kun føle begrænset smerte.

Når du er bedøvet, lægger lægen et dræn ind i din bughule ved hjælp af en kanyle. Drænet bliver tilkoblet en pose, hvor ascitesvæsken opsamles. Drænet sættes fast på din hud med plaster og forbindelse. Du skal herefter stå ud af sengen og bevæge dig rundt på afdelingen. Det vil ofte gøre tapningen af væsken lettere.

Tapningen varer typisk 4-5 timer, men tiden varierer meget fra patient til patient.

Vi fjerner drænet, inden du tager hjem, og sætter en selvklæbende drænpose på. Den kan du selv fjerne dagen efter.

Hvis du er indlagt, bliver du efter behandlingen kørt tilbage til sengeafsnittet, og du ligger med drænet i højst 24 timer.

Vær opmærksom under behandlingen

Du skal henvende dig til personalet, hvis:

- du observerer, at forbindingen bliver våd
- du observerer knæk på slangen

- du ser, at der ikke kommer væske ned i opsamlingsposen
- du ser, at der kommer blod i opsamlingsposen
- du får smerter i maven
- du føler, at du får feber

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Få taget blodprøver

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at få taget blodprøver inden behandlingen. Du får besked fra lægen, hvis det er tilfældet.

Kontakt os, hvis du får blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du kontakte sekretæren 3-4 dage før behandlingen, da du skal have kontrolleret blodfortyndingen (INR) og eventuelt holde pause med medicinen.

Spis kun lidt

Du behøver ikke at være fastende, men vi anbefaler, at du kun spiser et let måltid inden behandlingen.

Tøm blæren

Lige inden du får lagt drænet, skal du tømme din blære.

NÅR DU KOMMER HJEM

Svar på undersøgelse

Hvis væsken fra din bughule sendes til yderligere undersøgelse, kan der gå op til nogle dage, før vi modtager svar. Er du indlagt, vil du få svaret på stuegangen. Er du ambulant patient, vil du få svaret pr. brev eller telefon.

Planlægning af nyt besøg

Før du tager hjem, aftaler vi, hvornår du skal kontakte sygeplejersken for ny tapning af væske i dagafsnittet.



KONTROL

Eventuel blodprøvekontrol

Vi regulerer sandsynligvis i den vanddrivende behandling, inden du tager hjem. Dette kan indebære, at du cirka 1-2 uger efter skal have kontrolleret blodprøver. Du får besked herom af lægen eller sygeplejersken.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Dagafsnit for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Sekretær

Tlf. 97 66 35 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 14.00