

Når du skal have kemoterapi med Alimta®

Du skal i behandling med Alimta®, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Alimta® er et celledræbende stof, som påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING.

Inden behandlingen med Alimta® skal du gennemgå nogle forberedelser:

- Du skal have lavet en undersøgelse af dine nyrsers funktion. Du bliver indkaldt til undersøgelsen.
- 7 dage før behandlingen skal du begynde at tage Folimet (B-vitamin). Tag 1 tablet hver 2. dag. Du får udleveret tabletterne, når du er til samtale om behandlingen.
- 7 dage før behandlingen skal du have en indsprøjtning med B-vitamin (Betolvex®).

I forbindelse med kemobehandlingen, skal du tage Prednisolon:

- Dagen før kemobehandlingen klokken 8.00 skal du tage 2 tabletter Prednisolon a 25 mg.
- På dagen for kemobehandlingen kl. 8.00 skal du tage 2 tabletter Prednisolon a 25 mg.
- Dagen efter kemobehandlingen klokken 8.00 skal du tage 2 tabletter Prednisolon a 25 mg.

Du får udleveret Prednisolon, når du er til samtale om behandlingen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Eksem eller akne.** Behandlingen kan påvirke din hud, så du får eksem eller akne.
- **Irriterede slimhinder.**

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00