



Røntgenundersøgelse af spiserør

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af dit spiserør.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår ved, at vi røntgenfotograferer dit spiserør i forskellige positioner, mens du drikker kontrastvæske. Kontrastvæsken hjælper lægen med at tolke røntgenbillederne.

Du skal stå op – så vidt muligt – ved denne undersøgelse.

Først får du en mundfuld kontrastvæske. Kontrastvæsken har en tyktflydende konsistens, der føles som milkshake. Mens du synker denne, laver vi en optagelse af dit spiserør.

Dernæst laver vi undersøgelsen igen med forskellige vinkler. Vi afslutter ofte med at gentage undersøgelsen, mens du ligger ned.

Undersøgelsen varer 15-30 minutter.

Du må gerne have en forælder eller en anden voksen med ind til undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

NÅR DU KOMMER HJEM

Drik rigeligt dagen efter undersøgelsen

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt, det vil sige mere end sædvanligt, dagen efter undersøgelsen.

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan du læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'røntgenstråler og risici'.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Radiologisk Afdeling

Aalborg Syd

Tlf. 97 66 50 55

Mandag – torsdag

07.30 – 15.00

Fredag

07.30 – 14.30

Hobro

Tlf. 97 65 20 10

Mandag – torsdag

07.30 – 15.00

Fredag

07.30 – 14.30