



Sådan afhjælper du diarré

Du kan få diarré i dagene efter, du er blevet behandlet. Derfor får du udleveret medicin, der kan stoppe diarré. Vær opmærksom på, at du kun må tage medicinen, hvis du får diarré.

Medicinen hedder loperamid, og forhandles også under navnene Propiden, Imodium® og Imolope.

Det er vigtigt, at du tager medicinen i den dosis og den periode, som er beskrevet her.

SÅDAN GØR DU

Sådan afhjælper du diarré:

- Ved 1. diarre tages straks 2 tabletter loperamid sammen med et glas vand. Du må ikke knække eller knuse tabletterne.
- Tag derefter 1 tablet loperamid ved hver diarré.
- Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet.
- Drik cirka 3 liter væske i døgnet. Drik fx danskvand, sodavand, juice og suppe, da du har brug for ekstra salt og sukker, når du har diarré.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os, hvis du fortsat har diarré

Hvis du har diarré i mere end 24 timer på trods af behandlingen med loperamid, skal du kontakte os. Så tager vi stilling til, om du skal indlægges.

Kontakt os, hvis du ikke kan indtage medicin og væske

Hvis du ikke er i stand til at indtage loperamid eller ikke kan drikke tilstrækkeligt, skal du kontakte os.

Tag kun medicin efter aftale med lægen

Så længe du er i behandling med kemoterapi, må du kun tage afføringsmidler efter aftale med lægen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00