

## Sådan bruger du Symbicort i turbuhaler

Du skal behandles med medicinen Symbicort, som bruges til at behandle kronisk obstruktiv lungelidelse. Symbicort er en inhalationsmedicin, som du skal tage 2 gange i døgnet. Medicinen bruges til langtidsbehandling og er ikke beregnet til akutte tilfælde af åndenød.


### SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Symbicort er en kombinationsbehandling. Det betyder, at den både modvirker irritation og hjælper til at udvide luftvejene.


### SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

#### Følg vejledningen


Symbicort skal inhaleres gennem en inhalator, som kaldes en turbuhaler. Følg denne vejledning, når du skal tage medicinen.




Skru beskyttelseshætten af.



Hold turbuhaleren lodret, mens du drejer bundstykket 1 gang frem og tilbage, til der lyder et klik. Der udløses kun 1 dosis, selvom der lyder flere klik.



Tøm lungerne for luft. Pust ikke i turbuhaleren. Anbring mundstykket mellem tænderne og slut læberne tæt omkring. Tag en kraftig og hurtig indånding og hold vejret nogle få sekunder. Skru beskyttelselåget på igen.



*Når der er 20 doser tilbage, kommer en lille rød markering frem i toppen af det lille vindue. Når den røde markering når bunden af vinduet, er turbuhaleren tom.*

## BIVIRKNINGER

### Svamp i munden

Du kan forebygge svamp i munden ved at skylle munden grundigt eller børste tænder, efter du har taget medicinen.

### Hæshed

Du kan afhjælpe hæshed ved at spise, når du har brugt inhalatoren.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Rengør inhalatoren med en tør, ren klud cirka 1 gang ugentligt. Der må ikke komme fugt ned til medicinen.
- Husk at sætte beskyttelseshætten på efter brug.
- Udskift inhalatoren, når den er løbet tør for medicin.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Medicinsk Dagafsnit, Farsø**

Tlf. 97 65 31 10

Mandag – fredag 8.00 – 15.00