



Sådan tager du en afføringsprøve til måling af calprotectin

Calprotectin er et protein, som findes i blod, urin og afføring hos raske personer.

Ved inflammatoriske tarmsygdomme stiger niveauet for calprotectin i afføringen kraftigt. Undersøgelsen kan derfor med fordel bruges til at udrede patienter, der har haft diarré i længere tid.

Undersøgelsen kan også bruges til at følge patienter, der har fået konstateret inflammatorisk tarmsygdom, altså sygdom, hvor der er betændelse i tarmen.

SÅDAN GØR DU

Opsaml afføringsprøven

Du har fået udleveret et prøvesæt fra afsnittet. Brug skeen fra sættet og tag en klump afføring på størrelse med en stor ært og læg den i glasset.

Prøven kan holde sig i 5 døgn ved stuetemperatur. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at du tager prøven først på ugen og sender den umiddelbart efter.

Send afføringsprøven

Du har fået en kuvert med adresse. Læg prøven heri, og send kuverten med almindelig post eller aflever den på Klinisk Biokemisk Afdeling.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du skal regne med, at der går 2-3 uger, inden du får svar på undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.10 – 9.00,

torsdag dog 8.30 – 9.00

Alle hverdage også 13.00 – 14.30