

Sådan tager du en afføringsprøve til undersøgelse af elastase

Du skal tage en afføringsprøve, så vi kan undersøge indholdet af elastase (F-Elastase-1) i din afføring. Vi bruger undersøgelsen til at udrede patienter med fordøjelsesvanskeligheder og ernæringsproblemer, fx uforklarligt vægttab, kronisk diarré og fedtdiarré, eller til at udrede patienter med uforklarlige mavesmerter. Undersøgelsen kan også bruges til at følge patienter med fremadskridende sygdom i bugspytkirtlen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Der er ingen forberedelse til undersøgelsen.

SÅDAN GØR DU

Opsaml afføringsprøven

- Du har fået udleveret et prøvesæt fra afdelingen. Brug skeen fra sættet til at opsamle en klump afføring på størrelse med en stor ært. Læg den i glasset.
- Prøven kan holde sig i 5 døgn ved stuetemperatur. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at du tager prøven først på ugen og sender den umiddelbart efter.

Send afføringsprøven

- Sørg for, at der står navn og CPR-nummer på prøveglasset og på følgesedlen. Tag den selvklæbende strejkode af følgesedlen og sæt den på glasset.
- Skriv dato for opsamling af afføringsprøven på prøveglasset og følgesedlen.
- Læg prøveglasset i stofposen og derefter i plastikposen.
- Fjern den sølvfarvede beskyttelsesstrimmel på plastikposen, så posens kanter klæber sammen.
- Læg den forseglede pose i papomslaget og læg det i boblekuverten sammen med følgesedlen.

- Send kuverten med almindelig post, umiddelbart efter du har taget prøven. Du kan også aflevere kuverten på Klinisk Biokemisk Afdeling.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Der går 2-4 uger, inden du får svar på undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.10 – 9.00,

torsdag dog 8.30 – 9.00

Alle hverdage også 13.00 – 14.30