

Test af hjertets pumpekraft med dobutamin

Du skal have testet, om dit hjertes pumpekraft øges, når du får indholdsstoffet dobutamin via en plastikkanylen i din håndryg.

Når du har fået dobutamin, laver vi en såkaldt ekkokardiografi, som kan vise, om der er arvæv i venstre hjertekammer, og om der er tilstrækkelig blodforsyning til kranspulsårerne.

Vi bruger undersøgelsen til at planlægge dit videre undersøgelses- og behandlingsprogram. Derudover viser undersøgelsen, hvorvidt en forkalket hjerteklap er betydeligt forsnævret. Denne information danner grundlag for en vurdering af, hvorvidt hjerteklappen skal udskiftes.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Forberedelse

Først anlægger vi en lille plastikkanylen (venflon) i din håndryg, som vi bruger til at give dig medicin igennem, og du får taget hjertediagram (EKG) og målt blodtryk.

Undersøgelse

Lægen undersøger nu dit hjerte med ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet), og du får dobutamin gennem plastikkanylen. Det bevirker, at hjertet trækker sig kraftigere og hurtigere sammen. Der gives dobutamin i stigende doser med 3 minutters mellemrum.

Under undersøgelsen kontrollerer vi dit blodtryk og tager EKG med faste intervaller.

Du kan opleve hjertebanken under undersøgelsen. Hvis dit blodtryk falder, kan du også opleve utilpashed, som dog hurtigt fortager sig. Du kan også opleve hjertekrampe (angina pectoris) eller åndenød. Enkelte oplever hovedpine, en snurrende fornemmelse i hænder og fødder, træthed, kvalme, kulderystelser og vandladningstrang.

Der er en sygeplejerske til stede under undersøgelsen, som kan vejlede dig, hvis du bliver utilpas.

Selve undersøgelsen varer cirka 45 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for, at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise eller drikke fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke spise pastiller, bolsjer eller tyggegummi.

Smør dig ikke med bodylotion eller creme

Undlad at smøre dig med bodylotion før undersøgelsen, da det gør det svært at få elektroderne, som vi bruger ved ultralydsskanningen, til at sidde fast på din hud.

Medbring frugt eller madpakke

Det vil være en god idé, hvis du medbringer frugt eller en madpakke, som du kan spise efter undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Der er ingen forholdsregler efter undersøgelsen, og du må spise og drikke umiddelbart efter. Der er drikkevarer i venterummet.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du vil få besked på resultatet umiddelbart efter undersøgelsen. Det kan derfor være en god idé at tage en pårørende med til undersøgelsen, så både du og din



pårørende bliver informeret om resultatet af undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kardiologisk Ambulatorium
Tlf. 97 66 46 00