



Til dig, der har fået kontraststof

I forbindelse med din CT-skanning i Stråleterapien har du fået et jodholdigt kontraststof i en blodåre.

Du har muligvis følt varme, metalsmag og kvalme, da du fik kontraststoffet.

I sjældne tilfælde opstår der yderligere gener. Det kan være:

- udslæt på huden
- opkastning
- fornemmelser i halsen
- vejrtrækningsbesvær.

Derfor anbefaler vi, at du opholder dig i Stråleterapien i 30 minutter efter undersøgelsen.

Hvis du føler ubehag, kan du henvende dig til personalet. Personalet vil kontakte en læge, som vurderer dine symptomer.

Det er op til dig, om du vil gøre brug af tilbuddet, og du behøver ikke henvende dig til personalet, når du forlader Stråleterapien.

Vi anbefaler, at du bliver i Stråleterapien til klokken:

Du har fået dette kontraststof:

Navn _____

Mængde _____

Får du Interleukin-2, så gem denne information

Er du i behandling med Interleukin-2, bør du være opmærksom på, at du kan få allergi-lignende symptomer, typisk udslæt. Dette kan forekomme i op til 2 uger efter, at du har fået røntgenkontraststof. Sker dette, er det vigtigt, at du søger læge og medbringer denne information.

KONTAKT

Oplever du yderligere gener, efter at du har forladt afdelingen, skal du kontakte egen læge eller Lægevagten.