

Undersøgelse af mave-tarmkanalen

Du skal have foretaget en undersøgelse af mav-tarmkanalen, en såkaldt Meckels divertikel/ventrikel-skintigrafi.

Undersøgelsen viser, om du har en medfødt udposning på tyndtarmen (Meckels divertikel).

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får 2 indsprøjtninger

Du får lagt en plastikkanyle (venflon) i en blodåre i armen. Ubehaget kan sammenlignes med at få taget en blodprøve.

Herefter får du en indsprøjtning med mavesyrehæmmende medicin i en blodåre i armen. Medicinen forbedrer kvaliteten af de billeder, som vi tager af dig. Cirka 30 minutter senere får du en indsprøjtning med en lille mængde radioaktivt stof i samme plastikkanyle.

Der er ingen bivirkninger i forbindelse med medicinen eller den lille mængde radioaktivt stof.

Selve undersøgelsen

Du ligger på ryggen på et smalt leje, mens du bliver skannet over mave-tarmregionen. Under skanningen skal du ligge stille.

Selve skanningen varer cirka 1-1½ time.
Undersøgelsen varer i alt cirka 2½ time.



SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær fastende 3 timer inden mødetidspunktet

Du skal være fastende de sidste 3 timer før undersøgelsen. Du må gerne drikke vand og tage din medicin, som du plejer.

Vær opmærksom på andre fasteregler, hvis undersøgelsen evt. skal udføres under bedøvelse (kun relevant for små børn).

Hold pause, hvis du tager afføringsmidler

Hvis du tager afføringsmidler, skal du holde pause med dette i 2 døgn før undersøgelsen.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er gravid eller ammer, bedes du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret herfra inden for 5 hverdage.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling

Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:

Mandag – torsdag 7.30 – 15.00

Fredag 7.30 – 14.30