



Undersøgelse af, om du har behov for endnu en behandling med radioaktivt jod

Du har fået lavet en jodscintigrafi i forbindelse med din tidligere behandling med radioaktivt jod for kræft i skjoldbruskkirtlen.

Scintigrafien viser, at der fortsat er en rest af skjoldbruskkirtelvæv. Det er helt normalt på nuværende tidspunkt i dit behandlingsforløb. Det betyder ikke, at du aktuelt har kræft.

Det er ikke ud fra scintigrafien muligt at afgøre, om du skal have flere behandlinger med radioaktivt jod. Det vil vi derfor afgøre ud fra en yderligere undersøgelse, som er skitseret herunder.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal først til en informationssamtale hos os. Informationssamtalen foregår i Onkologisk Afdelings pavillon

_____ dag den _____ klokken _____

Her vil du få udleveret stoffet Thyrogen®, som du skal tage med hjem og opbevare i køleskab, indtil det skal bruges. Stoffet skal bruges ved en indsprøjtning, som hjemmesygeplejersken kommer hjem til dig og hjælper med.

UGEN FØR INDSPRØJTNINGEN

I ugen op til indsprøjtningen skal du sørge for at få taget blodprøver.

Søndag den _____ mellem klokken 10 og 14 skal du have en indsprøjtning med Thyrogen®. Hjemmesygeplejersken kommer hjem til dig og giver dig indsprøjtningen i din ene balde.

Mandag den _____ klokken _____ skal du få taget en blodprøve. Du bedes bestille tid på forhånd via www.booking.rm.dk
Efter blodprøvetagningen skal du til undersøgelse på afdeling D1. Her får du endnu en indsprøjtning med

Thyrogen® samt en lille dosis radioaktivt jod. Husk at medbringe Thyrogen®-sprøjten på afdeling D1. Herefter kan du gå hjem. Du skal ikke være isoleret.

Tirsdag den _____ klokken _____ skal du møde i afdeling D1 til en jodscintigrafi. Du får svar på undersøgelsen samme dag, når vi har resultatet af scintigrafien og dine blodprøver.

Der er 2 mulige udfald:

1. Du har ikke behov for yderligere behandling med radioaktivt jod, og du vil overgå til et kontrolforløb. Du vil blive indkaldt til en opfølgende samtale efter 7 – 14 dage. Første kontrol ligger 3-6 måneder efter denne undersøgelse.
2. Du har behov for yderligere behandling med radioaktivt jod. Hvis dette er tilfældet, begynder vi jodbehandling samme dag. Det vil betyde, at du skal være isoleret de næste 3 dage. Herefter får du lavet en ny jodscintigrafi. Du vil blive indkaldt til en samtale 7 – 14 dage efter denne undersøgelse og få svar. Desuden vil dit videre forløb blive skitseret og tilrettelagt.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne på Onkologisk Afdeling.



Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00