



تستطيع الحصول على نتيجة التحليل من

الطبيب الذي أرسلك بعد يوم تقريباً وهو مسؤول عن إعطائك
الإرشادات الكاملة عن النتيجة.

للاستفسار والمعرفة

إذا كان لديك أي استفسار أو سؤال عليك الاتصال على هذا الرقم
97664900

من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً.

فحص اختبار تحمل الجلوکوز في الجسم

من أجل تشخيص مرض السكري او تحمل الجلوکوز يجب ان يجري تحليل خاص لفحص نسبة الجلوکوز في الدم يبدأ الفحص بتناول كمية من محلول السكر ومن ثم يتم قياس نسبته في الدم.

هكذا يجري الفحص

عند مجيء الشخص الى المختبر او العيادة الخارجية
يجب عليه ان يتناول كمية من شراب السكر.

يكون حجم محلول حوالي 150 مل اذا لزم الامر يستطيع الشخص ان يشرب معه عصير الليمون ويجب شرب محلول في غضون 5 دقائق.

يستطيع الشخص ان يشرب من كأس الى كأسين من الماء خلال فترة الانتظار والتي تمتد ل ساعتين.
 يحدث بعض الأحيان غثيان او شعور بالآسياء بعد تناول هذا المشروب.

سحب الدم

في اثناء وبعد شرب محلول يجب على الشخص ان يبقى في العيادة او المختبر لمدة ساعتين بدون أكل ولا تدخين ولا نوم ولكن يستطيع ان لزم الامر الذهاب الى الحمام للأدرار.
بعد ساعتين من الانتظار يتم سحب عينة الدم من الذراع.

الفحص يأخذ مدة ساعتين ونصف تقريباً.

كيفية الاستعداد للفحص

جزء وقت
احجز وقت التحليل من خلال هذا الموقع booking.rn.dk

قبل ايام الشخص يجب على الشخص ان يمارس نشاطه البدني كالمعتاد وان يتناول نظام غذائي جيد بحيث يكون غني بالكاربوهيدرات التي يمكن الحصول عليها من البطاطة، الأرز، المعكرونة، الخبز.

يوم الفحص يجب على الشخص ان يكون صائماً
الصيام يجب ان يكون لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل التحليل.
وهذا يعني:

الامتناع عن الأكل أو مضغ العلكة.
يمكن ان تشرب من كأس الى كأسين من الماء في هذه الفترة.
(منع التدخين او استخدام لصقة النيكوتين او ما شابه ذلك).

الوقت المحدد للتحليل

في اليوم الذي يجب ان تعلم به التحليل يجب ان تأتي الى العيادة او المختبر قبل الساعة 8 صباحاً بربع ساعة.

الجهد الجسدي

يجب ان لا تتجه نفسك قبل التحليل
(عند مجيئك الى الفحص امتنع عن ركوب الدراجة الهوائية او الركض.)

عند الانتهاء من التحليل والرجوع للبيت